

レジメン名: LD+Carfilzomib 1クール

1クール: 28日

クール数: 1

対象疾患名: 再発・難治性の多発性骨髄腫

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day()	day(8)	day(9)	day()	day(15)	day(16)	day()	day(21)	day(22)	day()	day(28)
レブラミド	25 mg/body/日	内服		●	→	→	→	→	→	→	→	→	●			
レナデックス	(※1) mg/body/日	内服(※2)		●	●		●	●		●	●			●		
(※1) day1,8,15,22は40mg/body・day2,9,16は4mg/body (※2) day1,2,8,9,15,16はカイクロリス注投与1時間前・day22は朝食後																
カイクロリス	(※3) mg/m <sup>2</sup>	点滴		●	●		●	●		●	●					
(※3) 1クール目:1,2日目のみ20mg/m <sup>2</sup> ・以降は27mg/m <sup>2</sup>																

レジメン名: LD+Carfilzomib 2~12クール 1クール: 28日

クール数: 11

対象疾患名: 再発・難治性の多発性骨髄腫

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day()	day(8)	day(9)	day()	day(15)	day(16)	day()	day(21)	day(22)	day()	day(28)
レブラミド	25 mg/body/日	内服		●	→	→	→	→	→	→	→	→	●			
レナデックス	40 mg/body/日	内服(※1)		●			●			●				●		
(※1) day1,8,15はカイプロリス注投与1時間前・day22は朝食後																
カイプロリス	27 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●	●		●	●		●	●					

レジメン名: LD+Carfilzomib 13クール以降 1クール: 28日

クール数: 制限なし

対象疾患名: 再発・難治性の多発性骨髄腫

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day()	day(8)	day(9)	day()	day(15)	day(16)	day()	day(21)	day(22)	day()	day(28)
レブラミド	25 mg/body/日	内服		●	→	→	→	→	→	→	→	→	●			
レナデックス	40 mg/body/日	内服(※1)		●			●			●				●		
(※1) day1,15はカイクロリス注投与1時間前・day8,22は朝食後																
カイクロリス	27 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●	●					●	●					