

レジメン名： R2 1クール目

1クール： 28日

クール数： 1

対象疾患名： 再発・難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day()	day(8)	day()	day(15)	day()	day(21)	day(22)	day()	day(28)
レブラミド	20※ mg	内服		●	→	→	→	→	→	●			
※30 ≤ CCr < 60 の場合は10mg、CCr < 30 の場合は5mg													
レスタミンコーワ	20 mg	内服		●		●		●			●		
カロナール	500 mg												
リツキシマブ投与30分前に内服													
リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●		●		●			●		

レジメン名: R2 2~5クール目

1クール: 28日

クール数: 4

対象疾患名: 再発・難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day()	day()	day()	day()	day(21)	day()	day(28)
レブラミド	20※ mg	内服		●	→	→	→	→	●		
※30≤CCr<60 の場合は10mg、2サイクル終了後忍容可能な場合は15mgに増量する。CCr<30 の場合は5mg。											
レスタミンコーワ	20 mg	内服		●							
カロナール	500 mg										
リツキシマブ投与30分前に内服											
リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●							

レジメン名: R2 6~12クール目

1クール: 28日

クール数: 7

対象疾患名: 再発・難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day()	day()	day()	day()	day(21)	day()	day(28)
レブラミド	20※ mg	内服	1日1回	●	→	→	→	→	●		

※ $30 \leq \text{CCr} < 60$  の場合は10mg、2サイクル終了後忍容可能な場合は15mgに増量する。 $\text{CCr} < 30$  の場合は5mg。