



レジメン名: JALSG GML200 地固め療法① 白血球数3000/ $\mu$ L・血小板数100000/ $\mu$ L以上に回復次第

対象疾患名: 急性骨髄性白血病

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()
アプレピタント(オプション)	初日 125 2,3日目 80 mg	内服		●	●	●			
初日:抗癌剤投与1~1.5時間前2,3日目:午前中服用									
グラニセトロン	3 mg	点滴		●	●	●	●	●	
ノバントロン	7 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●	●	●			
70歳以上:5mg/m <sup>2</sup> に減量									
サンラビン	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●	●	●	●	●	



レジメン名: JALSG GML200 地固め療法③ 白血球数3000/ $\mu$ L・血小板数100000/ $\mu$ L以上に回復次第

対象疾患名: 急性骨髄性白血病

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()
アプレピタント(オプション)	初日 125 2,3日目 80 mg	1日1回		●	●	●			
初日:抗癌剤投与1~1.5時間前2,3日目:午前中服用									
グラニセトロン	100 mL	点滴		●	●	●	●	●	
アクラシノン	14 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●	●	●	●	●	
70歳以上:10mg/m <sup>2</sup> に減量アントラサイクリン既投与例では600mg/m <sup>2</sup> まで									
サンラビン	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●	●	●	●	●	

レジメン名: JALSG GML200 髄注

地固め③終了後

対象疾患名: 急性骨髄性白血病

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day()
メソトレキセート	15 mg/body	髄注		●	
キロサイド	40 mg/body	髄注		●	
プレドニン	10 mg/body	髄注		●	