

レジメン名: BD+Daratumumab 1~3クール 1クール: 21日

クール数: 3

対象疾患名: 再発・難治性の多発性骨髄腫

薬品名	投与量	投与方法	day(1)	day(2)	day()	day(4)	day(5)	day()	day(8)	day(9)	day()	day(11)	day(12)	day()	day(15)	day(16)	day()	day(21)
レナデックス	20 mg	内服		●※		●	●※			●※		●	●※					
※75歳を超える患者、過少体重(BMI:18.5 kg/m ² 未満)の患者、コントロール不良の糖尿病患者は省略可																		
レスタミンコーワ	50 mg	内服																
カロナール	1000 mg		●						●							●		
モンテルカスト	10 mg																	
デキサート	19.8 mg	静注(側管)	●						●						●			
ダラザレックス	16 mg/kg	点滴	●						●						●			
ベルケイド	1.3 mg/m ²	皮下注	●			●			●			●						

レジメン名: BD+Daratumumab 4~8クール 1クール: 21日

クール数: 5

対象疾患名: 再発・難治性の多発性骨髄腫

薬品名	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day()	day(4)	day(5)	day()	day(8)	day(9)	day()	day(11)	day(12)	day()	day(21)
レナデックス	20 mg	内服			●※		●	●※		●	●※		●	●※		
※75歳を超える患者、過少体重(BMI:18.5 kg/m ² 未満)の患者、コントロール不良の糖尿病患者は省略可																
レスタミンコーワ	50 mg	内服														
カロナール	1000 mg			●												
モンテルカスト	10 mg															
デキサート	19.8 mg	静注(側管)		●												
ダラザレックス	16 mg/kg	点滴		●												
ベルケイド	1.3 mg/m ²	皮下注		●			●			●			●			

レジメン名: BD+Daratumumab 9クール以降 1クール: 21日

クール数: 制限無し

対象疾患名: 再発・難治性の多発性骨髄腫

薬品名	投与量	投与方法		day(1)	day()	day(21)
レスタミンコーワ	50 mg	内服				
カロナール	1000 mg			●		
モンテルカスト	10 mg					
デキサート	19.8 mg	静注(側管)		●		
ダラザレックス	16 mg/kg	点滴		●		